

CARA
140 x 145 mm



ALEXIN®

75 LS



MASSO
AGRO DEPARTMENT

FUNGICIDA PARA O CONTROLO DO MILDIO DA VIDEIRA, MÍLDIO OU AGUADO DA LARANJEIRA, TANGERINEIRA, CLEMENTINA E HÍBRIDOS, LIMOEIRO E LIMA E PODRIDÃO DO COLO E DA RAÍZ DO MORANGUEIRO

COMPOSIÇÃO:

Líquido Solúvel (SL) contendo 755 g/l (51,7 % p/p) de fosfonatos de potássio.

Autorização de venda nº 0800 concedida pela DGAV.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE

RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.



Titular da autorização e fabricante:
Luxembourg Industries (PAMOL) Ltd., 27 Ha. Eilat - P.O. Box 13 - 81200 Eilat-Aviv (Israel)

Distribuído por:



COMERCIAL IMPORTA MASSO S.A.
Industria, 32 - 08019 Barcelona (Espanha) - Tel. +34 93 4 95 25 00

Delegação de Portugal:

Rua Beethoven, 1 - 1970-1970 Lisboa - MAIA
Contacto: +351 917 70356 (Chamada para a rede móvel nacional)
Email: info@masso.com - www.masso.com

Nº lote e data de fabrico:
Ver na embalagem

PESO NETO:

5 L

V5

DORS
140 x 145 mm

ALEXIN® 75 LS

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO: Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA: Não respirar as poeiras. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO: Contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250. Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

UFI: VVHA-Q1VN-C00K-T7KX

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES: Etila de segurança fornecida a pedido. Não respirar ou fumar durante a utilização do produto para proteção dos organismos aquáticos, respeitar a zona não pulverizada de 5 metros de relação às águas de superfície e 20 metros de relação aos organismos aquáticos. Evitar a zona não pulverizada de 20 metros de relação às águas de superfície, incluindo o metro sob o vegetal, em morangueiro e laranja. Não aplicar em locais secos e ventados, proteção dos trabalhos solares. Arejar os estufas trepadeiras antes da pulverização antes de nelas entrar. Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às culturas até à secagem do pulverizado.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO E EMBALAGENS

VAZIAS: A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



IMPORTANTE: Respeitar as utilizações, doses, condições e precauções de aplicação indicadas na etiqueta que foram definidos com base nas características do produto e culturas a que se destina. Proceder segundo as normas de boas práticas agrícolas, a cultura e os tratamentos sendo o utilizador responsável, no momento da sua decisão, por condições particulares da parcela como seja a natureza do solo, condições meteorológicas, métodos culturais, diversidade de vegetação, resistências de espécies... O fabricante garante a qualidade dos seus produtos vendidos na embalagem original e em conformidade com a autorização concedida pelo Ministério de Agricultura. Dado a diversidade de legislação existente, é recomendável nos casos onde este produto é utilizado para proteção das culturas verificar caso seja para exportação, a legislação do país importador da cultura. O distribuidor não será em nenhum caso responsável de consequências inerentes a cópias desta etiqueta, total ou parcial e à difusão ou utilização não autorizada da mesma.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS: ALEXIN® 75 LS pertence à família química dos fosfonatos. É uma substância sistémica (ascendente e descendente) com ação essencialmente preventiva atuando no mecanismo de defesa das plantas. Também possui reduzida ação direta sobre o patógeno, atuando no metabolismo fotossintético das folhas.

Código FRAC: GRUPO P07 FUNGICIDA

APLICAÇÕES AUTORIZADAS, DOSES E RECOMENDAÇÕES DE USO

Culturas	Doença	Dose	Nº de aplicações	Intervalo entre aplic.	Observações	P.S. (*)
Videira	Plasmopara viticola	300-400 ml/hl (máx 4 l/ha)	5	10 dias	De preferência utilizar o produto no período de vegetação até início de fecho dos cachos, e não fazer mais do que 5 aplicações/ano. Aplicar desde BBCH 16 (6ª folha) até BBCH 79 (todas as uvas do cacho se tocam).	14
Laranjeiras	Phytophthora spp	300-400 ml/hl (volume de calda máximo 2000 L/ha; máximo 8 L/ha)	2	90 dias	Realizar os tratamentos quando os frutos atingem 90% do seu tamanho final e o início da maturação dos frutos, quando estes comecem a ganhar a cor final (BBCH 79- 89).	15
Morangueiro	Phytophthora spp	300-400 ml/hl (volume de calda 750-1000 L/ha; máximo 4 L/ha)	3	20 dias	Tratar preventivamente, em condições favoráveis à ocorrência da doença, desde o início da floração até ao início do desenvolvimento dos frutos (BBCH 60-71).	3

*PS: Prazo de segurança entre o último tratamento e a colheita (dias).

Em videira, ALEXIN® 75 LS deve-se aplicar mediante pulverização foliar com trator ou manualmente (em vinha alta) e mediante pulverização com trator em vinha baixa com um máximo de 5 aplicações por campanha durante o período compreendido entre a aparição da 6ª folha até ao fecho do cacho. Evitar o ponto de gota ajustando a pressão e a velocidade de avanço da máquina de forma a que se cubra a vegetação de forma suficiente. Se recomenda tratar ambos os lados das linhas. Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (l/min), da velocidade e largura do trabalho (distância entrelinhas). Nas fases iniciais de desenvolvimento da cultura aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcional ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Nas regras das boas práticas agrícolas (manejo de possíveis resistências) se recomenda utilizar ALEXIN® 75 LS em combinação com produtos de contacto para controlo de mildio antes do surgimento da doença. Para um bom controlo do mildio, o tratamento com ALEXIN® 75 LS deve ser preventivo, ou seja, o produto deve ser aplicado antes de surgir a doença. Se chover nas 2 horas seguintes à aplicação se recomenda repetir o tratamento.

Não aplicar com temperaturas muito elevadas nem antes da poda. Não misturar com fertilizantes com azoto.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogêneo. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogênea. Deitar esta mistura no recipiente a completar o volume de água, agitando sempre.

RESTRICÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Existem castas de videiras que são sensíveis ao uso de ALEXIN® 75 LS. No entanto, é sempre aconselhável testar o produto numa pequena área antes de usá-lo em áreas maiores. As aplicações de primavera (2 primeiras aplicações) em mistura com COBRE NORDOX® 75 WG não devem ser feitas em vinhão, assim como noutras castas pouco vigorosas.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS: É aconselhado a uso de ALEXIN® 75 LS em programas de tratamentos que incluem o uso de fungicidas de contacto, com base em fialamidas, carbamatos ou compostos de cobre (óxido cuproso - COBRE NORDOX® 75 WG). Nestes casos, é aconselhável a utilização da concentração mais baixa com um intervalo entre as aplicações de 12-14 dias, consoante a pressão de doença. O produto não é compatível com fertilizantes foliares contendo azoto (nitrico ou amoniacal). Não fazer misturas com formulações à base de petróleo e não pulverizar o produto em culturas que tenham sido previamente tratadas com óleos, porque estes poderão inibir a penetração do produto na planta.

250001002

V5