800 mm

387,5 mm | 412,5 mm

20 mm | 177,5 mm | 380 mm | 182,5 mm | 20 mm | 20 mm

360 mm

# WELGRO® POTASIO

THE MIRACLE FERTILIZER

K+

**Product meets requirements for an EC-FERTILIZER**

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
PER EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DA UTILIZAÇÃO.

MASSÓ AGRO DEPARTMENT

Lote y fecha de fabricación: *Ver marcado impreso*
Partita n. e data di fabbricazione: *Vedi su questa confezione*
Lote e data de fabrico: *Ver impresso*

CE

CONTENIDO NETO:
CONTENUTO NETO:
CONTEÚDO NETO: **5 Kg**

## CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI - PFC1 (C)(I)(a)(ii)

**CONCIME MINERALE PK 16-42 CON MICROELEMENTI: BORO (B), FERRO (Fe), MANGANESE (Mn), MOLIBDENO (Mo) E ZINC (Zn)** • PER USO ORTICOLO

**WELGRO® POTASIO** è un concime completamente solubile in acqua impiegato per applicazioni fogliari. Si può impiegare su tutte le colture, ma è raccomandato per quelle più esigenti in Potassio quali i fruttiferi, agrumi, vite, olivo, patata, barbabietola da zucchero e orticole da frutto.

**WELGRO® POTASIO** migliora la qualità ed il colore, così come tutte le caratteristiche organolettiche della frutta, aumenta il contenuto in zuccheri dell'uva e della frutta in generale e della barbabietola da zucchero.

**MODALITÉ E DOSI D'IMPIEGO**

**WELGRO® POTASIO** si applica alla dose comune di 150-250 g/hl su fruttiferi in generale, su agrumi e colture ortive. Inoltre:
- **Pomodoro:** Effettuare 1 o 2 trattamenti dopo la comparsa di tutte le inflorescenze alla dose di 150-250 g/hl. In fertirrigazione si può applicare durante la formazione dei frutti e la loro maturazione alla dose di 3-5 kg/ha settimanalmente.
- **Patata:** Intervenire all'inizio delle formazione dei tuberi e 15-21 giorni dopo alla dose di 2-2,5 kg/ha.
- **Bietola da zucchero:** Intervenire a 6 e 3 settimane dalla raccolta alla dose di 2 kg/ha.
- **Vite (in particolare quella da vino):** Applicare il prodotto dalla chiusura del grappolo sino alla maturazione alla dose di 2-4 kg/ha.
- **Olivo:** Trattare dopo l'indurimento del nocciolo e sino alla maturazione alla dose di 0,5-1 Kg/hl.

**WELGRO® POTASIO** è miscibile con i più comuni fitofarmaci utilizzati sulle colture per le quali se ne consiglia l'impiego.

**DA UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO. NON SUPERARE LE DOSI DI APPLICAZIONE. CONSERVARE IL PRODOTTO IN UN LUOGO ASCIUTTO E BEN VENTILATO, LONTANO DALLA LUCE SOLARE DIRETTA. TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE TRA 5 E 35°.**
**I CONTENITORI PARZIALMENTE UTILIZZATI DEVONO ESSERE CHIUSI CORRETTAMENTE.**

PERICOLO

H318 Provoca gravi lesioni oculari. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.
**Contiene:** Solfato di potassio acido (come impurità del solfato di potassio)
**Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni. Tel. 02 6610 1029.
**UFI: A3DX-00XQ-6004-JVAT**

Prodotto conforme al Regolamento 2019/1009 CE

## ADUBO INORGÂNICO COMPOSTO SÓLIDO DE MACRONUTRIENTES - CFP1 (C)(I)(a)(ii)

**ADUBO MINERAL PK 16-42 DE MICRONUTRIENTES: BORO (B), FERRO (Fe), Manganês (Mn), MOLIBDENIO (Mo) E ZINCO (Zn)**

ADUBO PARA APLICAÇÃO FOLIAR NA FORMA DE CRISTAIS SOLÚVEIS EM ÁGUA

**WELGRO® POTASIO** é um fertilizante totalmente solúvel em água que se destina a aplicação foliar. Dado o seu alto teor em potássio é recomendado para as culturas mais exigentes neste elemento: fruteiras, citrinos, videira, oliveira, batateira, beterraba e hortícolas destinadas à produção de frutos.
**WELGRO® POTASIO** melhora a qualidade, coloração, tamanho e características organolépticas dos frutos e aumenta a teor em açúcar das uvas e outros frutos e ainda o da beterraba sacarina.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, CONCENTRAÇÕES E/OU DOSES MODO DE EMPREGO**
- **Fruteiras, citrinos e hortícolas:** Aplicar 150-250 g/hl de água desde a queda das pétalas.
- **Tomateiro:** Efectuar 1-2 aplicações, após o vingamento dos frutos de cada ramalhete floral é medida que este se vai processando. Usar 150-250 g/hl de água. Em fertirrigação pode-se aplicar durante a frutificação e maturação a 3-5 kg/ha, semanalmente.
- **Batateira:** Efectuar 2 aplicações, no início da tuberização e 30-45 dias depois. Usar 2-2,5 kg/ha de adubo em cada aplicação.
- **Beterraba:** Efectuar 2 aplicações, 45 e 21 dias antes da colheita a 2 kg/ha.
- **Videira:** Utilizar o adubo, especialmente em videiras cujas uvas se destinam à vinificação, efectuando 2-4 aplicações desde o fecho dos cachos até à maturação, à razão de 2-4 kg/ha.
- **Oliveira:** Aplicar, na concentração de 0,5-1 kg/hl, desde o endurecimento do caroço até à maturação.

**WELGRO® POTASIO** pode misturar-se com outros fertilizantes. Em caso de dúvida, consultar a Delegação Portuguesa da COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

**UTILIZAR APENAS EM CASO DE COMPROVADA NECESSIDADE. NÃO EXCEDER AS DOSES DE APLICAÇÃO RECOMENDADAS. CONSERVAR O PRODUTO EM UM ESPAÇO SECO E BEM VENTILADO, LONGE DA LUZ SOLAR DIRETA. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO ENTRE 5 E 35°. EVITE O CONTATO COM ÁCIDOS E BASES FORTES. OS RECIPIENTES PARCIALMENTE USADOS DEVEM SER FECHADOS ADEQUADAMENTE.**

PERIGO

H318 Provoca lesões oculares graves. P102 Manter fora do alcance das crianças. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 Usar vestuário de proteção, proteção ocular, proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310 Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.
**Contém:** Hidrogenossulfato de potássio (como uma impureza de sulfato de potássio)
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos Tel.: 800 250 250.
**UFI: A3DX-00XQ-6004-JVAT**

Consulte para mais informação

Distribuito da:
**COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**
Succursale ITALIA
Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
Tel: +39 02 0996 0102
E-mail: info.italia@massoagro.com
www.massoagro.com

Distribuído da:
**COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**
Delegação de PORTUGAL
Rua Bento de Moura Portugal, 58 - 4470-107 MOREIRA-MAIA
Tel.: +351 229 479 000 (Chamada para a rede móvel nacional)
E-mail: massoagro@mail.pt
www.massoagro.com

8 424084 401957

## CONTENIDOS DECLARADOS / CONTENUTI DICHIARATI / TEORES DECLARADOS

| | | |
|---|---|---|
| Nitrógeno (N) total | Azoto (N) totale | Azoto (N) total ..... 0% |
| Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) total | Anidride fosforica ($P_2O_5$) totale | Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) total ..... 16% |
| Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en agua | Anidride fosforica ($P_2O_5$) idrosolubile | Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en agua ..... 16% |
| Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro | Anidride fosforica ($P_2O_5$) solubile in citrato ammonico neutro | Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato de amonio neutro ..... 16% |
| Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua | Ossido di potasio ($K_2O$) idrosolubile | Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua ..... 42% |
| Boro (B) (sodio) soluble en agua | Boro (B) (sodio)idrosolubile | Boro (B) (sodio) soluble en agua ..... 0,02% |
| Hierro (Fe) quelado por EDTA, soluble en agua | Ferro (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile | Ferro (Fe) quelado con EDTA, soluble em água ..... 0,52% |
| Manganeso (Mn) quelado por EDTA, soluble en agua | Manganese (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile | Manganês (Mn) quelado com EDTA, solúvel em água ..... 0,12% |
| Molibdeno (Mo) (amonio) soluble en agua | Molibdeno (Mo) (ammonio) idrosolubile | Molibdeno (Mo) (amónio) solúvel em água ..... 0,005% |
| Zinc (Zn) quelado por EDTA, soluble en agua | Zinco (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile | Zinco (Zn) quelatado com EDTA, solúvel em água ..... 0,05% |
| Agente quelante: EDTA<br>Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: 3-6. | Agente chelante: EDTA<br>Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata: 3-6. | Agente quelatante: EDTA<br>Intervalo de pH que garante uma boa estabilidade da porção quelatada: 3-6. |

**Granulometría / Dimensione minima dei granuli:**
Polvo. El 90% de producto pasa por un tamiz de 1 mm.
Polvere. Il 90% del prodotto passa attraverso un setaccio di 1 mm.
Pó. 90% do produto passa por um peneiro de 1 mm.

**INGREDIENTES / INGREDIENTI:**
Sulfato potásico (nº CAS 7778-80-5) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes), Fosfato monopotásico (nº CAS 7778-77-0) (CMC1).
Solfato di potassio (nº CAS 7778-80-5) (CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo), Fosfato monopotassico (nº CAS 7778-77-0) (CMC1).
Sulfato de potássio (nº CAS 7778-80-5) (CMC1: Substâncias e misturas virgens), Fosfato monopotássico (nº CAS 7778-77-0) (CMC1).

## ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES - CFP1 (C)(I)(a)(ii)

**ABONO MINERAL PK 16-42 CON MICRONUTRIENTES: BORO (B), HIERRO (Fe), MANGANESO (Mn), MOLIBDENO (Mo) Y ZINC (Zn)**

ABONO PARA APLICACIÓN FOLIAR EN FORMA DE CRISTALES SOLUBLES EN AGUA

**WELGRO® POTASIO** es un fertilizante totalmente soluble en agua que se aplica en pulverización foliar. Puede aplicarse a cualquier cultivo, pero está especialmente recomendado en los exigentes en potasio, como frutales, cítricos, vid, olivo, patata, remolacha y hortícolas de fruto.
**WELGRO® POTASIO** mejora la calidad, color, tamaño y características organolépticas de los frutos y, cosa muy importante, aumenta el contenido en azúcares de la uva y otros frutos así como de la remolacha.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** **WELGRO® POTASIO** se aplica a la dosis general de 150-250 g/hl en frutales, cítricos y hortícolas.

**CONDICIONES PARTICULARES**
- **Tomate:** 1-2 tratamientos después del cuajado de cada ramillete floral a la dosis de 150-250 g/hl. En fertirrigación puede aplicarse durante la fructificación y maduración a 3-5 kg/ha, semanalmente.
- **Patata:** 2 tratamientos al inicio de la tuberización y 30-45 días después a la dosis de 2-2,5 kg/ha.
- **Remolacha:** 2 tratamientos 45 días antes de la cosecha y 15-21 días antes de la misma a 2 kg/ha.
- **Vid (especialmente para vinificación):** 2-4 tratamientos desde el cierre del racimo hasta la maduración a 2-4 kg/ha.
- **Olivo:** Aplicar desde el endurecimiento del hueso hasta la maduración a dosis de 0,5-1 kg/hl.

**WELGRO® POTASIO** puede mezclarse con la mayoría de productos agroquímicos utilizados en los cultivos en que se recomienda. En caso de duda consultar a COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

**UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD. NO DEBE SOBREPASARSE LA DOSIS DE APLICACIÓN. ALMACENE EL PRODUCTO EN UN ESPACIO SECO Y BIEN VENTILADO ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO ENTRE 5 Y 35°. LOS ENVASES PARCIALMENTE USADOS DEBEN CERRARSE CORRECTAMENTE.**

PELIGRO

H318 Provoca lesiones oculares graves. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 Llevar ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA.
**Contiene:** Hidrogenosulfato de potasio (como impureza del sulfato de potasio)
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
**UFI: A3DX-00XQ-6004-JVAT**

Diríjanse para más información

ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGFITO.

* Marca registrada por: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Barcelona

BOLSA/SACCHETTO/SAQUETA LDPE 4

Fabricado/Fabbricante/Fabricante:
Fabricado en España por:

MASSÓ
**COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**
Villadomat, 321- 5º - 08029 Barcelona (España)
Tel. +34 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoagro.com

V3.2

Topo 20 x 8 mm

www.massoagro.com