800 mm

20 mm | 177.5 mm | 380 mm | 182.5 mm | 20 mm | 20 mm

360 mm

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI - PFC1 (C)(I)(a)(ii)
CONCIME MINERALE NPK 17-30-15 CON MICROELEMENTI: BORO (B), FERRO (Fe), MANGANESE (Mn), MOLIBDENO (Mo) E ZINCO (Zn)
CONCIME PER USO ORTICOLO

WELGRO® STANDARD Plus è un concime fogliare altamente concentrato con qualità dimostrata, totalmente solubile. Permette un'apportazione equilibrata di macro e microelementi, necessari per uno sviluppo ottimale della pianta. Il suo alto contenuto in fosforo lo converte in un prodotto particolarmente indicato per la primavera, per favorire la fioritura e la cascola. In seguito si raccomanda di continuare i trattamenti con **WELGRO® OLIVO CLASSIC**, **WELGRO® FRUIT** o **WELGRO® POTASIO**.

Può essere applicato in qualsiasi tipo di coltivazione: olivo, alberi da frutta, agrumi, fragola, vigneti e pergolati di vite, ortaggi, patata, barbabietola da zucchero, cipolla, ornamentali, etc.

DOSE Y MODO D'IMPIEGO

- **Ortaggi e fragola:** applicare ogni 15 giorni alla dose di 200-250 g/hl fino a fine fioritura (coltivazioni da frutto) o fino alla fine della coltivazione (coltivazioni da foglia commestibile).
- **Patata e barbabietola:** trattamenti ogni 15 giorni alla dose di 2-3 kg/ha fino all'inizio della tuberizzazione. Dopo, continuare i trattamenti con **WELGRO® POTASIO** (2-3 kg/ha) per incrementare in contenuto di amido/saccarosio.
- **Cipolla:** realizzare due (2) trattamenti, con polverizzazione normale, mescolandolo con un bagnabile:
  1º: nello stadio di tre foglie, alla dose di 1 kg/ha.
  2º: all'inizio della formazione del bulbo, alla dose di 1,5 kg/ha.
  Tre settimane dopo il secondo trattamento, applicare **WELGRO® POTASIO** alla dose di 2-3 kg/ha.
- **Alberi da frutto e agrumi:** realizzare un trattamento dopo la fioritura, alla dose di 200-300 g/hl. Dopo la cascola, trattare con **WELGRO® POTASIO**.
- **Olivo:** realizzare due (2) trattamenti, aggiungendo un bagnant.
  1º: germoglio, alla dose di 0,5-1 kg per 100 litri d'acqua.
  2º: all'inizio della fioritura (10% fiore aperto), alla dose di 300-500 g per 100 lts d'acqua.

Dopo la cascola, si raccomanda di realizzare due (2) trattamenti alla dose di 150-250 g/hl (agrumi) con **WELGRO® POTASIO** e 500-1000 g/hl (olivo) con **WELGRO® OLIVO CLASSIC** o **WELGRO® POTASIO OLIVO Plus**.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P270 Non ingerire, né bere né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti, indossare indumenti protettivi.

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

DA UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO.
NON SUPERARE LE DOSI DI APPLICAZIONE.
CONSERVARE IL PRODOTTO IN UN LUOGO ASCIUTTO E BEN VENTILATO, LONTANO DALLA LUCE SOLARE DIRETTA. TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE TRA 5 E 35º.
I CONTENITORI PARZIALMENTE UTILIZZATI DEVONO ESSERE CHIUSI CORRETTAMENTE.

ARVAN

Per maggiori informazioni scansiona il codice QR

ADUBO INORGÂNICO COMPOSTO SÓLIDO DE MACRONUTRIENTES - CFP1 (C)(I)(a)(ii)
ADUBO MINERAL NPK 17-30-15 DE MICRONUTRIENTES: BORO (B), FERRO (Fe), MANGANÊS (Mn), MOLIBDENIO (Mo) E ZINCO (Zn)
ADUBO PARA APLICAÇÃO FOLIAR NA FORMA DE CRISTAIS SOLÚVEIS EM ÁGUA

WELGRO® STANDARD Plus é um fertilizante foliar de alta concentração e qualidade garantida, totalmente solúvel. Permite um fornecimento equilibrado de macro e microelementos, necessário para um bom desenvolvimento da planta. O seu alto teor em Fósforo faz com que seja um produto indicado para utilizar na Primavera para favorecer a floração e o vingamento. Nas seguintes aplições, recomenda-se utilizar **WELGRO® OLIVO CLASSIC**, **WELGRO® FRUIT** o **WELGRO® POTASIO**.

Pode-se aplicar em qualquer cultura: olival, fruteiras, cítrinos, morangueiros, vinhas, horticolas, batata, beterraba, cebolas, ornamentais, etc.

DOSES E MODO DE EMPREGO

- **Horticolas e morangueiros:** aplicar a cada 15 dias na dose de 200-250 g/hl até ao final da floração (culturas de fruto) ou até final da cultura (culturas de folha comestível).
- **Batata e beterraba:** Tratamentos quinzenais na dose de 2-3 kg/ha até ao inicio da tuberização. Depois, continuar os tratamentos com **WELGRO® POTASIO** (2-3 kg/ha) para melhorar o conteúdo em amido/sacarose.
- **Cebola:** Realizar dois (2) tratamentos, em pulverização normal, misturando com molhante:
  1º: no estado de três folhas, na dose de 1 kg/ha.
  2º: no inicio da formação do bulbo, na dose de 1,5 kg/ha.
  Três semanas depois do segundo tratamento, aplicar **WELGRO® POTASIO** na dose de 2-3 kg/ha.
- **Fruteiras e cítrinos:** realizar um tratamento depois da floração, na dose de 200-300 g/hl. Depois do vingamento dos frutos, tratar com **WELGRO® POTASIO**.
- **Olival:** realizar dois (2) tratamentos, acrescentando um molhante.
  1º: brotação, na dose de 0,5-1 kg por 100 litros de água.
  2º: no inicio da floração (10% flor aberta), na dose de 300-500 g por 100 litros de água.

Depois do vingamento, se recomenda realizar dois (2) tratamentos na dose de 150-250 g/hl (cítrinos) com **WELGRO® POTASIO** e 500-1000 g/hl (olival) com **WELGRO® OLIVO CLASSIC** o **WELGRO® POTASIO OLIVO Plus**.

P102 Manter fora do alcance das crianças. P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização. P280 Usar luvas de protenção, vestuário de protenção.

Este adubo contém ureia, que pode libertar amoníaco e afetar a qualidade do ar. Devem ser tomadas medidas corretivas adequadas em função das condições locais.

UTILIZAR APENAS EM CASO DE COMPROVADA NECESSIDADE.
NÃO EXCEDER AS DOSES DE APLICAÇÃO RECOMENDADAS.
CONSERVAR O PRODUTO EM UM ESPAÇO SECO E BEM VENTILADO, LONGE DA LUZ SOLAR DIRETA.
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO ENTRE 5 E 35º.
OS RECIPIENTES PARCIALMENTE USADOS DEVEM SER FECHADOS ADEQUADAMENTE.

Digitalizar para mais informação

Distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Succursale ITALIA:
Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
Tel. +39 02 0996 6107
E-mail: info.it@uacqmasso.com

Distribuido por:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Delegação de MARINHA GRANDE:
Rua Banda de Música de Marinha Grande, 2430-197 MARINHA GRANDE
Contacto: (+351) 244 765 350 (chamada para a rede nacional)
Email: info@masso-agro.com www.massoagro.com

WELGRO® STANDARD plus

THE MIRACLE FERTILIZER

Product meets requirements for an EC-FERTILIZER

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
PER EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DA UTILIZAÇÃO.

MASSÓ AGRO DEPARTMENT

Lote y fecha de fabricación: *Ver marcado impreso*
Partida n. e data di fabbricazione: *Vedi su questa confezione*
Lote e data de fabrico: *Ver impresso*

BOLSA/SACCHETTO/SAQUETA LDPE 4

CONTENIDO NETO:
CONTENUTO NETTO:
CONTEÚDO NETO:

CE **5 Kg**

CONTENIDOS DECLARADOS / CONTENUTI DICHIARATI / TEORES DECLARADOS

Nitrógeno (N) total	Azoto (N) totale	Azoto (N) total 17%
Nitrógeno (N) nítrico	Azoto (N) nitrico	Azoto (N) nítrico 3,3%
Nitrógeno (N) amoniacal	Azoto (N) ammoniacale	Azoto (N) amoniacal 5,0%
Nitrógeno (N) ureico	Azoto (N) ureico	Azoto (N) úrico 8,7%
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) total	Anidride fosforica (P_2O_5) totale	Pentóxido de fósforo (P_2O_5) total 30%
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua	Anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile	Pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água 30%
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro	Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro	Pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em citrato de amónio neutro 30%
Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua	Ossido di potasio (K_2O) idrosolubile	Óxido de potássio (K_2O) solúvel em água 15%
Boro (B) (sodio) soluble en agua	Boro (B) (sodio) idrosolubile	Boro (B) (sódio) solúvel em água 0,02%
Hierro (Fe) quelado por EDTA, soluble en agua	Ferro (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile	Ferro (Fe) quelatado com EDTA, solúvel em água 0,52%
Manganeso (Mn) quelado por EDTA, soluble en agua	Manganese (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile	Manganês (Mn) quelatado com EDTA, solúvel em água 0,12%
Molibdeno (Mo) (amonio) soluble en agua	Molibdeno (Mo) (ammonio) idrosolubile	Molibdénio (Mo) (amónia) solúvel em água 0,005%
Zinc (Zn) quelado por EDTA, soluble en agua	Zinco (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile	Zinco (Zn) quelatado com EDTA, solúvel em água 0,05%
Agente quelante: EDTA	Agente chelante: EDTA	Agente quelatante: EDTA

Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: 3-6.
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-6.
Intervalo de pH que garante uma boa estabilidade da porção quelatada: 3-6.

INGREDIENTES / INGREDIENTI: Fosfato monoamónico (nº CAS 7722-76-1) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes), Nitrato potásico (nº CAS 7757-79-1) (CMC1), Urea cristalina (nº CAS 57-13-6) (CMC1), Fosfato monopotásico (nºCAS 7778-77-0) (CMC1). / Fosfato monoamonico (nº CAS 7722-76-1) (CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo), Nitrato potassico (nº CAS 7757-79-1) (CMC1), Urea cristallina (nº CAS 57-13-6) (CMC1), Fosfato monopotassico (nºCAS 7778-77-0) (CMC1). / Fosfato monoamonico (nº CAS 7722-76-1) (CMC1: Substâncias e misturas virgens), Nitrato potássico (nº CAS 7757-79-1) (CMC1), Ureia cristalina (nº CAS 57-13-6) (CMC1), Fosfato monopotássico (nºCAS 7778-77-0) (CMC1).

Granulometria/Granulometria: Polvo. El 90% de producto pasa por un tamiz de 1 mm. / Polvere. Il 90% del prodotto passa attraverso un setaccio di 1 mm. / Pó. 90% do produto passa por um peneiro de 1 mm.

ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES - CFP1 (C)(I)(a)(ii)
ABONO MINERAL NPK 17-30-15 CON MICRONUTRIENTES: BORO (B), HIERRO (Fe), MANGANESO (Mn), MOLIBDENO (Mo) y ZINC (Zn)
ABONO PARA APLICACIÓN FOLIAR EN FORMA DE CRISTALES SOLUBLES EN AGUA

WELGRO® STANDARD Plus es un fertilizante foliar de alta concentración y calidad contrastada, totalmente soluble. Permite un aporte equilibrado de macro y microelementos, necesarios para un buen desarrollo de la planta. Su alto contenido en Fósforo lo convierte en un producto especialmente indicado en primavera, para favorecer la floración y el cuajado. Posteriormente se recomienda continuar los tratamientos con **WELGRO® OLIVO CLASSIC**, **WELGRO® FRUIT** o **WELGRO® POTASIO**.

Puede aplicarse a cualquier tipo de cultivo: olivo, frutales, cítricos, fresales, viñedos y parrales de vid, hortalizas, patata, remolacha, cebollas, ornamentales, etc.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

- **Hortalizas y fresales:** aplicar cada 15 días a la dosis de 200-250 g/hl hasta el final de la floración (cultivos con fruto) o hasta el final del cultivo (cultivos de hoja comestible).
- **Patata y remolacha:** tratamientos quincenales a la dosis de 2-3 kg/ha hasta el inicio de la tuberización. Después, continuar los tratamientos con **WELGRO® POTASIO** (2-3 kg/ha) para mejorar el contenido en almidón/sacarosa.
- **Cebolla:** realizar dos (2) tratamientos, en pulverización normal, mezclándolo con un mojante:
  1º: en el estadio de tres hojas, a la dosis de 1 kg/ha.
  2º: al inicio de la formación del bulbo, a la dosis de 1,5 kg/ha.
  Tres semanas después del segundo tratamiento, aplicar **WELGRO® POTASIO** a la dosis de 2-3 kg/ha.
- **Árboles frutales y cítricos:** aplicar a partir de la floración y durante el cuajado de frutos, a la dosis de 200-300 g/hl. Después del cuajado, tratar con **WELGRO® POTASIO**.
- **Olivo:** realizar dos (2) tratamientos, añadiendo un mojante.
  1º: brotación, a la dosis de 0,5-1 kg por 100 litros de agua.
  2º: al inicio de la floración (10% flor abierta), a la dosis de 300-500 g por 100 litros de agua.

Después del cuajado, se recomienda realizar dos (2) tratamientos a la dosis de 150-250 g/hl (cítricos) con **WELGRO® POTASIO** y 500-1000 g/hl (olivo) con **WELGRO® OLIVO CLASSIC** o **WELGRO® POTASIO OLIVO Plus**.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P270 No comer, beber ni fumar durante la utilización. P280 Llevar guantes de protección, ropa de protección.

Este abono contiene urea que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.

UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD.
NO DEBE SOBREPASARSE LA DOSIS DE APLICACIÓN.
ALMACENE EL PRODUCTO EN UN ESPACIO SECO Y BIEN VENTILADO ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO ENTRE 5 Y 35º.
LOS ENVASES PARCIALMENTE USADOS DEBEN CERRARSE CORRECTAMENTE.

Escanea para más información

ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGFITO.

® Marca registrada por/Marchio registrato da/Marca registada por: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Barcelona

Fabricante/Fabbricante/Fabricante:
Distribuido en España por:

MASSÓ

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 221, 5º · 08029 Barcelona (España)
Tel. +34 93 495 25 00 · Fax +34 93 495 25 02
E-mail: massoa@qmasso.com · www.massoagro.com

8 424084 041667

V21

www.massoagro.com