

140 x 145 mm

WELGRO[®] ZINC



ABONO INORGÁNICO SIMPLE A BASE DE MICRONUTRIENTES - CFP1 (C)(II)(a)
SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE MICRONUTRIENTES
 ZINC COMPLEJADO POR ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO (HGA)

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI - PFC1 (C)(III)(a)
CONCIME IN SOLUZIONE A BASE DI MICROELEMENTI
 ZINCO COMPLESSATO CON ACIDO EPTGLUCONICO (HGA)

ADUBO INORGÂNICO ELEMENTAR DE MICRONUTRIENTE - CFP1 (C)(III)(a)
ADUBO DE MICRONUTRIENTES EM SOLUÇÃO
 ZINCO COMPLEXADO COM ÁCIDO HEPTAGLUCÔNICO (HGA)

CONTENIDOS DECLARADOS:
 6% Zinc (Zn) soluble en agua
 6% Zinc (Zn) complejo por HGA
 Agente complejo: HGA
 Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción complejada: 2-12

LISTA DE INGREDIENTES: Heptagluconato de zinc (EC: 946-329-1)(CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes)

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y PARA O MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD. NO DEBE SOBREPASARSE LA DOSIS DE APLICACIÓN.

CONTENUTI DICHIARATI:
 6% Zinco (Zn) idrosolubile
 6% Zinco (Zn) complessato con HGA
 Agente complessante: HGA
 Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione complessata: 2-12

ELENCO DEGLI INGREDIENTI: Eptagluconato di zinco (EC: 946-329-1) (CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo)

PER EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

DA UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO. NON SUPERARE LE DOSI DI APLICAZIONE.

TEORES DECLARADOS:
 6% Zinco (Zn) solúvel em água
 6% Zinco (Zn) complexo com HGA
 Agente complexado: HGA
 Intervalo de pH que garante uma boa estabilidade de porção complexada: 2-12

LISTA DE INGREDIENTES: Heptagluconato de zinco (EC: 946-329-1)(CMC1: Substâncias e misturas à base de matérias vírgens)

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

UTILIZAR APENAS EM CASO DE COMPROVADA NECESSIDADE. NÃO EXCEDER AS DOSES DE APLICAÇÃO RECOMENDADAS.

GARRAFA/BOTTIGLIA/GARRAFA
 TAPON/TAPPO/TAMPA

HDPE 2
 HDPE 2

Lote y fecha de fabricación: Ver marcado en el peso
 Partita n° e data di fabbricazione: Verdi sulla confezione
 N° lote e data de fabrico: Ver na embalagem



CONTENIDO NETO/CONTÊUDO NETO/PESO NETTO:

5 L (6,5 Kg)

V.1.1

140 x 145 mm

CARACTERÍSTICAS: EFICACIA: WELGRO[®] ZINC es eficaz incluso en terrenos muy ácidos o muy calcáreos, asegurando el suministro de zinc en cualquier tipo de suelo. **RAPIDEZ DE ACCIÓN:** WELGRO[®] ZINC, al ser derivado de un azúcar natural (glucosa), entra en el metabolismo de la planta por vía foliar o radicular (riego por goteo o inyección) con gran rapidez. A los 10-12 días de la aplicación ya se observan los primeros efectos de WELGRO[®] ZINC. **SEGURIDAD:** WELGRO[®] ZINC es un producto seguro y no causa ningún problema de fitotoxicidad en los cultivos tratados, sea por vía foliar o radicular (inyección o riego por goteo). **PERSISTENCIA:** La persistencia de acción de WELGRO[®] ZINC, depende de muchos factores tales como el grado de deficiencia, método de aplicación (foliar, inyección o riego por goteo), dosis, lluvia, etc. **FACILIDAD DE USO:** WELGRO[®] ZINC tiene un gran solubilidad en el agua, de modo que no se producen obturaciones de goteros o boquillas. **COMPATIBILIDAD:** WELGRO[®] ZINC es compatible con muchos productos insecticidas, fungicidas y fertilizantes, líquidos o cristalinos. **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Conserve únicamente en el envase de origen, en lugar fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Temperatura de almacenamiento entre 5 y 35°. Evite el contacto con ácidos y bases fuertes. Los envases parcialmente usados o dañados deben cerrarse correctamente. / P103 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 Llevar ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. **GESTIÓN DE FINES:** Este envase, una vez usado, espere utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión de residuos. **OBSERVACIONES:** WELGRO[®] ZINC es químicamente estable, de larga vida y no se ve afectado por la acción de la luz. Las dosis aquí apuntadas, varían según el método de aplicación (gotas, aspersión, inyección, etc.), según la gravedad de la carencia diagnosticada y según el estado de la planta; para mayor información, consultar nuestro servicio técnico.

CARATTERISTICHE: EFFICACIA: WELGRO[®] ZINC è efficace anche nei terreni molto acidi o ricchi in calcare, ed è perciò in grado di soddisfare il fabbisogno della pianta in zinco in tutte le condizioni pedologiche. **RAPIDITÀ D'AZIONE:** Il WELGRO[®] ZINC, grazie alla presenza di uno zucchero naturale, l'acido eptagluconico, entra nel metabolismo della pianta molto rapidamente sia per via foliare che radicale. A 10-12 giorni dalla applicazione, in particolare se la coltura è stata debitamente irrigata, si possono facilmente osservare gli effetti benefici dovuti alla sua azione. **SICUREZZA:** WELGRO[®] ZINC è un prodotto sicuro il cui impiego non comporta nessun rischio di fitotossicità, sia se applicato per via foliare che radicale (fertirrigazione, iniezione o a goccia). **PERSISTENZA:** La persistenza di azione di WELGRO[®] ZINC dipende da molti fattori quali la gravità della carenza, il metodo di applicazione, la dose di impiego, le precipitazioni piovose, ecc. Le dosi suggerite sono in grado di soddisfare il fabbisogno lungo tutto il ciclo colturale. **FACILITÀ D'IMPIEGO:** Il WELGRO[®] ZINC possiede una elevata solubilità in acqua e per questo il suo impiego non comporta nessun rischio di intasamento di filtri ed ugelli. **COMPATIBILITÀ:** Il WELGRO[®] ZINC è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci e dei concimi, siano essi in formulazione liquida o solida. **CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:** Conservare solo nel contenitore originale, in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore e luce solare diretta. Temperatura di conservazione tra 5 e 35°. Evitare il contatto con acidi e basi forti. I contenitori parzialmente utilizzati o danneggiati devono essere chiusi correttamente. P103 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **OSSERVAZIONI:** WELGRO[®] ZINC è chimicamente stabile nel tempo e non è sensibile alla degradazione della luce. Le dosi suggerite sono in funzione della modalità di impiego e la loro efficacia varia a seconda della gravità della carenza diagnosticata ed a seconda dello stadio di sviluppo della pianta. Per ulteriori informazioni, consultare il Dipartimento Tecnico.

CARACTERÍSTICAS: EFICACIA: WELGRO[®] ZINC es eficaz tanto en terrenos muy ácidos como calcáreos, asegurando el suministro de zinc en cualquier tipo de suelo. **RAPIDEZ DE ACCIÓN:** WELGRO[®] ZINC, al ser derivado de un azúcar natural (glucosa), entra en el metabolismo de la planta por vía foliar o radicular (riego goteo o inyección). Al fin de 10-12 días de la aplicación se observan los primeros efectos de WELGRO[®] ZINC. **SEGURIDAD:** WELGRO[®] ZINC es un producto seguro y no causa ningún problema de fitotoxicidad en los cultivos tratados, sea por vía foliar o radicular (inyección o goteo). **PERSISTENCIA:** La persistencia de acción de WELGRO[®] ZINC, depende de muchos factores tales como el grado de deficiencia, método de aplicación (foliar, inyección o goteo-a-gota), dosis, pluviosidad, etc. **FACILIDAD DE USO:** WELGRO[®] ZINC tiene una gran solubilidad en el agua, de modo que no se producen obturaciones de los bicos dos aparatos. **COMPATIBILIDAD:** WELGRO[®] ZINC es compatible con quase todos los productos pesticidas e fertilizantes, líquidos o cristalinos. **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Conserve únicamente en el embalaje original, en local fresco e bem ventilado, longe de fontes de calor e luz solar directa. Temperatura de armazenamento entre 5 e 35°. Evite o contato com ácidos e bases fortes. Os recipientes parcialmente usados o danificados devem ser fechados adequadamente. / P103 Manter fora do alcance das crianças. P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auditiva. **OBSERVAÇÕES:** WELGRO[®] ZINC é quimicamente estável, duradouro e não é afetado pela ação da luz. As doses aqui mencionadas, variam segundo o método de aplicação (gota-a-gota), aspersão, injeção, etc.), segundo a gravidade da carência detectada, segundo o estado da planta; para mais informação, consultar o nosso departamento técnico.

FRUTALES	Incorporación al suelo/aplicaciones al terreno/incorporação no solo	Viveros/n vivaio/viveiros: 2-10 cc/pie/planta/pé Arboles jóvenes/plante giovani/árvores jovens: 4-25 cc/pie/planta/pé Arboles en/plante in/árvores em prod.: 6-35 cc/pie/planta/pé
FRUTÍFERI	Pulverización foliar/aplicazioni fogliari/pulverização foliar	300 cc/hl desde la brotación/a partire dalla fioritura/desde la brotação
FRUTEIRAS	Incorporación al suelo/aplicaciones al terreno/incorporação no solo	Plantas jóvenes/plante giovani/Plantas jovens: 2,5-10 cc/pie/planta/pé
PARRAL Y VID	Pulverización foliar/aplicazioni fogliari/pulverização foliar	300 cc/hl desde la brotación/a partire dalla fioritura/desde la brotação
VITE DA VINO	Incorporación al suelo/aplicaciones al terreno/incorporação no solo	Viveros/n vivaio/viveiros: 2,5-15 cc/pie/planta/pé Arboles jóvenes/plante giovani/árvores jovens: 15 - 100 cc/pie/planta/pé Arboles en/plante in/árvores em prod.: 80 - 250 cc/pie/planta/pé
DA TAVOLA	Pulverización foliar/aplicazioni fogliari/pulverização foliar	300 cc/hl antes de abrir la flor, tras la caída de pétalos y en la brotación de verano/prima della fioritura, tra la caduta petali e la fioritura invernale/antes da floração, após a queda das pétalas e no início da brotação de verão
VIDEIRA	Incorporación al suelo/aplicaciones al terreno/incorporação no solo	1-2 l/ha
CÍTRICOS	Pulverización foliar/aplicazioni fogliari/pulverização foliar	0,5-1 l/ha
AGRUMI	Incorporación al suelo/aplicaciones al terreno/incorporação no solo	200-400 cc/hl según gravedad de la carencia/a seconda della gravità/segundo a gravidade da situação
CITRINOS	Pulverización foliar/aplicazioni fogliari/pulverização foliar	11/ha
FRESÓN	Incorporación al suelo/aplicaciones al terreno/incorporação no solo	2-2,5 l/ha en 3 aplicaciones/suddivisi 3 applicazioni/en 3 aplicações
FRAGOLA	Rieq. por goteo/irrig. a goccia/reg. localizada	
MORAN- GUEIRO	Pulverización foliar/aplicazioni fogliari/pulverização foliar	
REMOLACHA/		
BARBABITOLA		
DA ZUCCHERO/BETERRABA		
CESPEDES Y CAMPOS DE GOLF/SIEPI E CAMPI DA GOLF/RELVAOS E CAMPOS DE GOLF		
CEREALES/CEREALES/CEREAIS		

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS DE APLICACIÓN/MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO/INSTRUÇÕES DE USO E DOSE DE APLICAÇÃO:

NOTA IMPORTANTE: Los datos aquí contenidos se han obtenido tras profundos estudios y trabajos de campo; sin embargo los resultados de su aplicación varían en función de la climatología, época, etc., factores éstos que escapan a nuestro control. La Compañía garantiza el contenido y riqueza del producto.

AVVERTENZE: Le informazioni riportate sono il risultato di studi approfonditi e di sperimentazioni di campo; i risultati delle applicazioni variano in funzione dell'andamento climatico, dello sviluppo vegetativo e dell'epoca di applicazione, fattori indipendenti dalla qualità del prodotto. Commercial Química Massó SÁ garantiza la qualità del prodotto e la concentrazione in elementi nutritivi.

NOTA IMPORTANTE: Os dados aqui referidos foram obtidos através de profundos estudos e ensaios de campo; contudo os resultados da aplicação do produto variam com o clima, época de aplicação e com outros factores que escapam ao nosso controlo pelo que a Empresa apenas se responsabiliza pelos teores e natureza dos nutrientes indicados.

Envasado y distribuido por/Prodotto e distribuito da/Fabricado e distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
 Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (España) Tel. +34 93 495 25 00
 E-mail: masso@cqqmasso.com - www.massoagro.com

Succ. ITALIA: Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano)

Tel. +39 02 0996 6107 - E-mail: info.italia@cqqmasso.es

Del. de PORTUGAL: Rua Banda de Música de Moreira, 58 - 4470-197 MOREIRA-MAIA

Contacto: +351 917 765 356 (Chamada para a rede móvel nacional) - E-mail: franito@cqqmasso.com

* Marca registrada por/ Marchio registrato da: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Barcelona

V.1.1