

270 x 145 mm

**PRECAUÇÕES
TOXICOLÓGICAS,
ECOTOXICOLÓGICAS
E AMBIENTAIS**

PERIGO

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H370 Afeta os órgãos (pulmões) se inalado.

H373 Pode afetar os órgãos (sistema circulatório) após exposição prolongada ou repetida.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P260 Não respirar a nuvem de pulverização.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P308+P311 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P314 Em caso de indisposição, consulte um médico.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501a Eliminar o conteúdo e embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH208 Contém acequinoxil e bronopol CI MIT. Pode provocar uma reação alérgica.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe3PT2 Pomóides: Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 m em relação às zonas não cultivadas. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 70% de redução no arrastamento da calda pulverizada.

SPe3PT2 Ornamentais: Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 m em relação às zonas não cultivadas. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 70% de redução no arrastamento da calda pulverizada.

SPe3PT2 Citrinos: Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 25m em relação às zonas não cultivadas. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 30% de redução no arrastamento da calda pulverizada.

SPo5 Arejar bem as estufas tratadas até à secagem do pulverizado antes de nelas voltar a entrar.

SPoPT12 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção, capuz e proteção facial durante a preparação da calda; luvas de proteção, vestuário de proteção e capuz durante a aplicação do produto.

SPoPT15 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

SPoPT7 Intervalo de reentrada: 4 horas após a aplicação.

UFI: UR4P-M33P-4MAM-WNRG

ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Tel.: 800 250 250.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de recolha autorizado. As águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA: As recomendações e informações que figuram nos frutos são o resultado de estudos e ensaios. Contudo, durante a utilização do produto podem intervir inúmeros fatores que escapam ao nosso controlo (preparação de misturas, aplicação, climatologia, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável por danos causados (falha de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.



KANEMITE®

ACARICIDA DE CONTATO UTILIZADO NO COMBATE DE ÁCAROS
FITÓFAGOS (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*) DE CULTURAS
HORTÍCOLAS, CITRINOS, POMÓIDES, PRUNÓIDES E ORNAMENTAIS

Suspensão concentrada (SC) com 154 g/L ou 15,8 % (p/p) de acequinoxil.

O KANEMITE® é um acaricida de contacto que contém acequinoxil.

Autorização de venda n.º 732, concedida pela DGV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,

RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Lote n.º e data de produção: ver embalagens

CAPACIDADE: 1 L

KANEMITE® é uma marca registada pela Agro-Kanesho CO. LTD., Tóquio (Japão)

Fabricado pela: AGRO-KANESHO CO. LTD., 2-19 Akasaka 4-chome, Minato-ku, Tóquio (Japão)

Titular da autorização de venda / distribuidor por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (Espanha)
Tel. +34 93 495 25 00 - E-mail: massoi@cqmasso.com - www.massagro.com

Delegação de PORTUGAL: Rua Banda de Música de Moreira, 58 - 4470-197 MOREIRA-MAIA
Contacto: +351 917 765 356 (Chamada para a rede móvel nacional) - E-mail: franito@cqmasso.com



UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Pragas	Concentração (ml/hl)	Dose (L/ha)	Época de aplicação	Observações
Laranjeira, Tangerineira (inclui Clementina e híbridos)		100 - 120	1,0 a 1,2	Realizar a aplicação desde o aparecimento dos frutos até o amadurecimento dos frutos (BBCH 51-89).	Realizar no máximo 1 aplicação por ciclo cultural. Volume de calda: 1000 a 3000 L/ha.
Nespreira, Macieira, Pereira, Pereira-Nashi, Marmeleiro, Macieira-Brava	Aranhinho vermelho (<i>Panonychus ulmi</i>)	120 - 180	1,0 a 1,2	Realizar a aplicação desde 50% de rebentos desenvolvidos até o amadurecimento dos frutos (BBCH 35-89).	Efetuar no máximo 1 aplicação por ciclo cultural. Volume de calda: 1000 a 1500 L/ha.
Pessegueiro (inclui Nectarina), Aveleira	Aranhinho amarelo (<i>Eriophyes</i> spp.)			Realizar os tratamentos desde o aparecimento das inflorescências até o início da maturação (BBCH 50-80).	Efetuar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural. Persistência biológica: 10 a 14 dias. Volume de calda: 1000 L/ha.
Tomateiro, Beringela (ar livre e estufa)		100 - 120	1,0 a 1,2	Aplicar ao aparecimento da praga.	Efetuar no máximo 3 aplicações por ciclo cultural. Persistência biológica: 7 dias. Volume de calda: 1000 L/ha.

Use menor autorizado no seguimento do pedido da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais

Cultura	Pragas	Concentração (ml/hl)	Dose (L/ha)	Época de aplicação	Observações
Ornamentais (de corte e/ou em vaso) para produção de folha, flor e/ou fruto*	Aranhinho vermelho (<i>Panonychus ulmi</i>)	100 - 120	1,0 a 1,2	Tratar ao aparecimento da praga	Efetuar no máximo 3 aplicações por ciclo cultural. Persistência biológica: 7 dias. Volume de calda: 1000 L/ha.

*A eficácia e fitotoxicidade resultantes desta utilização menor é da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

INTERVALO DE SEGURANÇA: 3 dias em tomateiro e beringela, 21 dias em aveleira, 28 dias em laranjeira, tangerineira (inclui clementina e híbridos) e nespreira; 30 dias em macieira, pereira, pereira-nashi, marmeleiro, macieira-brava e pessegueiro (inclui nectarina).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS: O KANEMITE® é incompatível com as formulações contendo dodina e fosetil de alumínio. A sua utilização com produtos altamente alcalinos não é recomendada.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES, RESPEITANTES A TODAS AS FINALIDADES: O produto oferece um controle colateral dos ácaros eriofídeos que infestam estas culturas (*Phytomenus* sp., *Eriophyes* sp.) De acordo com os princípios de proteção integrada é aconselhável intervir quando atingido o NEA.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO: Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Utilize a pressão indicada pelo fabricante, de forma a assegurar a uniformidade na distribuição de calda.

Volume de água a utilizar: Para aproveitar ao máximo as características do KANEMITE®, é aconselhável intervir no início da infestação com um volume de água para assegurar um humedecimento uniforme e abundante da vegetação de 1000 a 3000 L/ha de água em citrinos, 1000 a 1500L/ha em pomóides, prunóides (pessegueiro incluindo nectarinas e aveleira) e 1000 L/ha em tomateiro, beringelas e ornamentais.

