

140 x 145 mm

WELGRO[®] MAR CREMA[®] Ecolicitor[®]

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO
LÍQUIDO CONCENTRADO DE ALGAS DEL *ASCOPHYLLUM*
NODOSUM CON UN CLARO EFECTO ESTIMULANTE Y
ENRAIZANTE DE LOS CULTIVOS
HIDROSOLUBLE

COMPOSICIÓN: Residuo sólido: 26% p/p (300 g/l); Ácido alginico: 4,25% p/p (48 g/l); Manitol: 1,25% p/p (14 g/l); K₂O soluble en agua: 1% p/p (11,4 g/l); Densidad: 1,14; Materia orgánica: 19% p/p (216,6 g/l); Materia inorgánica: 7% p/p (79,5 g/l); Solubilidad: >99,5%; pH: 5; Conductividad eléctrica: 45 ds/m

WELGRO[®] MAR CREMA Ecolicitor[®] actúa como un estimulante para el cultivo, incrementando las funciones fisiológicas del mismo así como mejorando su respuesta frente a condiciones adversas o procesos patológicos. Entre sus numerosas propiedades, cabe destacar su **POTENTE EFECTO ENRAIZANTE** cuando se aplica en fertirrigación. Puede ser aplicado en pulverización foliar o en fertirrigación en todos los cultivos incluido el cultivo hidropónico.

APTO PARA AGRICULTURA BIOLÓGICA.

AGITAR ANTES DE USAR.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E O AMBIENTE, SIGA AS INSTRUÇÕES.



Producto utilizable en agricultura ecológica de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 y 2021/1165. Control ECOCERT F - 32600.
 Produto autorizado na agricultura biológica em conformidade com os Regulamentos (UE) 2018/848 e 2021/1165. Controle ECOCERT F - 32600.

OUTROS ADUBOS E PRODUTOS ESPECIAIS
EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO DO GÉNERO
ASCOPHYLLUM NODOSUM PARA APLICAÇÃO FOLIAR E
FERTIRRIGAÇÃO
ADUBO HIDROSSOLÚVEL

RIQUEZA GARANTIDA: Matéria orgânica: 19% p/p (216,6 g/l); Óxido de potássio total (K₂O): 1,8% p/p (20,52 g/l); Matéria prima de origem orgánica: Extrato de algas; Condutividade eléctrica: 45 ms/cm; pH: 4-5,5

WELGRO[®] MAR CREMA Ecolicitor[®] atua como um estimulante para a cultura, aumentando assim as funções fisiológicas da mesma e também melhorando a sua resposta a condições adversas ou processos patológicos. Entre as suas inúmeras propriedades, destaca-se o seu **PODEROSO EFECTO DE ENRAIZAMENTO** quando aplicado na fertirrigação.

Inscrito no Registo Nacional de Matérias Fertilizantes Não Harmonizadas como N° 208/2027.

Lote y fecha de fabricación:
 Ver marcado impreso

N° lote y data de fabrico:
 Ver na embalagem

CONTENIDO NETO:
CONTEÚDO NETO:

5 LITROS
(5,7 Kg)

V.1

140 x 145 mm

WELGRO[®] MAR CREMA[®] Ecolicitor[®]

DOSIS Y MODO DE EMPLEO / DOSES E MODO DE EMPREGO:

CULTIVO / CULTURA	DOSIS / DOSE	MOMENTO DE APLICACIÓN / APLICAÇÃO
Semilleros / Viveiros	30 cc/10 l (para 100 m ²)	Una vez germinadas las semillas. / Uma vez fixada a planta.
Tomate, berenjena, pimiento / Tomate, berinjela, pimento	1,5-2 l/ha	Una aplicación en el trasplante y posteriores cada 15 días. / Primeira aplicação em transplante e depois cada 15 dias.
Platanera / Bananeira	2-2,5 l/ha	Efectuar 3-4 tratamientos desde la salida del invierno. / Efectuar 4 tratamentos desde o final do inverno.
Patata / Batata	2 l/ha	Primera aplicación a los 10 cm de planta. Repetir cada 15 días. / Primeira aplicação quando a planta tenha 10 cm. Repetir cada 15 dias.
Cucurbitáceas	1,5-2 l/ha	Iniciar con plantas a 3-4 hojas. Repetir cada 15 días. / Iniciar as primeiras aplicações quando a planta tenha 3-4 folhas, repetindo cada 15 dias.
Otras hortalizas de hoja, bráscas, tubérculos, alcachofa, etc. / Outras hortícolas de folha, bráscas, tubérculos, alcachofa, etc.	1-2 l/ha (150 cc/ml)	Primera aplicación a 3 - 4 hojas. Posteriormente cada 15-21 días. / Primeira aplicação com 3-4 folhas. Repetindo cada 15-21 dias.
Fresa / Fambuesa / Morango / Framboesa	1,5 l/ha	Desde que la planta esté enraizada. Continuar cada 15 días. / Iniciar tratamentos quando a planta está enraizada e repetir a cada 15 dias.
Frutales de pepita / Frutales de semente	1,5-2 l/ha (200 cc/hl)	Botón rosa, inicio floración, caída de pétalos. / Botões cor de rosa, início da floração, queda das pétalas.
Frutales de hueso / Frutais de nêso	1,5-2 l/ha (200 cc/hl)	Inicio floración, caída de pétalos, fruto cuajado. / Inicio da floração, queda das pétalas e vingamento.
Cítricos / Cítrinos	2-2,5 l/ha (150 cc/hl)	Desde brotación 4 tratamientos. / Efectuar 4 aplicações desde a brotação.
Olivo / Olival	2-2,5 l/ha (150 cc/hl)	Brotaçón, floración y cuajado (3 tratamientos). / Três tratamentos desde a brotação até à floração.
Vid y parra / Parral e vinha	1,5 l/ha	En los estados E-F, H y J. / Efectuar 4 aplicações nos estados: (EF), (G), (H), (I) e (J).
Alfalfa / Luzerna	2,5 l/ha	Después de cada corte. / Depois de cada corte.
Céspedes / Relvados ornamentales	4 l/ha	A la salida del invierno y después de cada corte. / Na saída do inverno e depois de cada corte.

Aplicaciones en fertirrigación, se recomienda utilizar 3 - 4 l/ha. / Em aplicações em fertirrigação, se recomenda utilizar 3-4 l/ha.

No mezclar con aceites, ni con productos muy ácidos y usar dosis bajas en mezcla con azufres, productos a base de calcio y correctores metálicos.

Mezcla: Agitar bien el producto antes de abrirlo. Llenar el tanque de aplicación con la mitad de la cantidad de agua necesaria. Comenzar la agitación del contenedor y añadir lentamente la cantidad necesaria de producto. Soluciones diluidas del producto deberán ser aplicadas en 24h.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P261 Evitar respirar el polvo, la niebla. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 Llevar guantes de protección, ropa de protección. P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Este producto puede manchar la piel tras la exposición prolongada.

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



Não misturar com óleos ou produtos altamente ácidos e usar baixas doses misturadas com azúfres, produtos à base de cálcio e revisores de metal.

Mix: Agite o produto antes de abri-lo. Aplicação de enchimento com metade da quantidade de água necessária. Iniciar a agitação do tanque e lentamente adicione a quantidade necessária do produto. Soluções diluídas do produto se aplicam dentro de 24 horas.

P102 Manter fora do alcance das crianças. P261 Evitar respirar as poeiras, névoas. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 Usar luvas de protecção, vestuário de protecção. P332+P313 Em caso de irritação cutânea: Consultar um médico. Este produto pode manchar a pele em caso de exposição prolongada.

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO: Conservar o produto na embalagem de origem fechado em local seco e ao abrigo de temperaturas extremas (5-45°C).

Distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
 Viladomat 321, 5^a - Tel. +34 93 495 25 00 - 08029 Barcelona (España)
 E-mail: masso@cqmasso.com - www.massosoagro.com

Delegação de PORTUGAL: Rua Banda de Música de Moreira, 58 - 4470-197 MOREIRA-MAIA
 Contacto: +351 917 765 356 (Chamada para a rede móvel nacional) - E-mail: franito@cqmasso.com

Fabricado por:



WELGRO[®] Marca registrada por COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
 Ecolicitor[®] Marca registrada por BioAtlantis Ltd

BioAtlantis Ltd.
 Clash Industrial Estate - Tralee, Co. Kerry (Ireland)
 Tel. +353 (0) 66 711 8477 - www.bioatlantis.com

V.1