



#### ATENÇÃO

conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

UFI: D642-40F2-1000-UCQW

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS. TEL. 800 250 250.

SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. SPe3a Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície. SPoPT1 Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de proteção e os objetos contaminados.

SPe1 Para proteção dos organismos do solo e plantas não visadas, não aplicar este produto ou qualquer outro produto contendo cobre a doses superiores a 8kg Cu/ha/ano, no mesmo solo.

SPe3 ara proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10m em relação às águas de superfície em castanheiro.

**NOTA:** Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

SPPT3 A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha devendo estes ser entregues num centro de recepção do sistema VALORFITO.



Detentor da autorização provisória de venda:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.  
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (Espanha) Tel. +34 93 495 25 00  
E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoaagro.com

Delegação de Portugal: Rua Banda de Música de Moreira, 58 - 4470-197 MOREIRA-MAIA - Contacto: +351 917 765 356 (Chamada para a rede móvel nacional) Email: franito@cqmasso.com



Fabricante: NORDOX A/S  
Østensjoveien, 13 - N-0661 - Oslo (Noruega)  
Tel.: 00 47 22975000 - Fax: 00 47 22975000

**PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**  
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P391 Recolher o produto derramado. P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P501 Eliminar o

**APLICAÇÕES E CONCENTRAÇÕES DE USO:** O COBRE NORDOX® 75 WG é um fungicida inorgânico de superfície e acção preventiva. Localizase sobre os órgãos tratados assegurando a protecção externa graças à sua acção de contacto. Está recomendado para combater o mildio da videira, o olho-de-pavão da oliveira, os pedrados e a moniliose da macieira e da pereira, a bacteriose (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidae*) do kiwi.

| CULTURAS           | CONC.g/hl | DOENÇAS              |
|--------------------|-----------|----------------------|
| Videira            | 270       | mildio               |
| Oliveira           | 200       | olho-de-pavão        |
| Macieira e pereira | 270       | pedrados e moniliose |

Uso menor autorizado no seguimento do pedido das associações portuguesas

| CULTURA      | CONC.g/hl | DOENÇA     |
|--------------|-----------|------------|
| Kiwi*        | 37,5 - 50 | bacteriose |
| Castanheiro* | 60 - 80   | septoriose |

\* A eficácia e fitotoxicidade resultantes desta utilização menor é da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

**ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** Videira: Mildio: Aplicar apenas nos dois últimos tratamentos, após à limpeza se as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença. / Oliveira: Olhode-pavão: Realizar o primeiro tratamento antes da queda das primeiras chuvas outonais. Se as condições climáticas decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença, repetir o tratamento 3 semanas depois. / Macieiras e pereiras: Pedrados e moniliose: Realizar uma aplicação ao aparecimento da ponta verde das folhas (Estado fenológico B-C). Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com este ou outros produtos à base de cobre. / Kiwi: Bacteriose: Efectuar máximo de 3 tratamentos durante o período vegetativo, a partir do abrolhamento a cada 30 dias com interrupção na floração e o último tratamento, até 20 dias antes da colheita. / Castanheiro: Septoriose: Efectuar máximo de 3 tratamentos entre o fim da floração até 20 dias antes da colheita (intervalo entre aplicação 14 dias).

**INTERVALO DE SEGURANÇA:** 7 dias em macieira, oliveira, pereira e videira. 20 dias em castanheiro e kiwi.

**MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA:** No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária, juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

**MODO DE APLICAÇÃO:** Calibrar adequadamente o equipamento. As concentrações referidas destinam-se a pulverizações em alto volume (1000 l/ha). Quando a aplicação se faz com aparelhos a névoa ou baixo volume (turbinas ou atomizadores) a concentração deve ser aumentada de tal modo que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume.

# COBRE NORDOX® 75 WG

# COBRE NORDOX® 75 WG

## FUNGICIDA

Grânulos dispersíveis em água com 75% (p/p) de cobre (sob a forma de óxido cuproso)

Autorização provisória de venda n.º 3468 concedida pela DGAV



Produto autorizado na agricultura biológica em conformidade com os Regulamentos (UE) 2018/848 e 2021/1165 e de acordo com o Regulamento NOP Controle ECOCERT F - 32600. ESTE PRODUTO RESPEITA OS REQUISITOS DE DÉMETER-INTERNATIONAL.

Nº lote e data de fabrico:  
Ver na embalagem

**P102 MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**EUH401 PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.**

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.**

CONTEÚDO NETO:

## 200 g



Fabricante:  
**NORDOX A/S**  
Østensjoveien, 13 - N-0661 - Oslo (Noruega)  
Tel.: 00 47 22975000 - Fax: 00 47 22975000