

RESERVA VERNIS

CULTIVO CULTURA CULTURA	MODO DE EMPLEO MOD. D'IMPIEGO MODO DE APLICAÇÃO	DOSIS RECOMENDADAS DOSI RACCOMANDATE DOSES RECOMENDADAS
Almendro Mandorlo Amendoeira	Aplicar antes de floración para inducir el cuajado. Trattare prima della fioritura per favorire l'allegagione. Aplicar antes da floração para induzir o vingamento.	0,2-0,5 Kg/ha
Alfalfa y leguminosas Erba medica e leguminose in generale Luzerna y leguminosas	En leguminosas en general, aplicar a la 4-6ª hoja. En alfalfa aplicar cada 2-3 cortes. Ayuda a fijar nitrógeno atmosférico y aumentar el nº de nódulos. Su leguminose in generale, applicare al momento della 4ª-6ª foglia. Su erba medica applicare ogni 2-3 sfalci. Aiuta a fissare l'azoto atmosferico e ad aumentare il numero di noduli. Em leguminosas em geral, aplique na 4-6ª folha. Na luzerna aplicar a cada 2-3 cortes. Ajuda a fixar o azoto atmosférico e a aumentar o número de nódulos.	0,2-0,5 Kg/ha
Berries (fresa, arándano, frambuesa,...etc) Fragola e piccoli frutti (mirtillo, lampone,...) Bagas (morango, mirtillo, framboesas)	Aplicar antes de floración para mejorar el cuajado de los frutos y en caso de deficiencias de Mo. Trattare prima della fioritura per favorire l'allegagione e/o in caso di carenza di Mo. Aplicar antes da floração para melhorar vingamento e em caso de carências de Mo.	0,2-0,5 Kg/ha
Brásicas Brassiche Brássicas	Aplicar para corregir "hojas de rabo", hojas con menor ancho de limbo y un crecimiento normal del nervio central, debido a deficiencias de Mo. Con deficiencias acusadas, se puede aplicar cada 10-15 días. Applicare per correggere le carenze di Mo. Nel caso di carenze molto forti, ripetere le applicazioni ogni 10-15 giorni. Aplicar para corrigir carências de Mo. Com deficiências acentuadas, pode ser aplicado a cada 10-15 dias.	0,2-0,3 Kg/ha
Citricos Agrumi Cítricos	Aplicar desde antes de la floración hasta el cuajado del fruto para favorecer la fertilidad del polen y en engorde de frutos para evitar la caída de flores y frutos pequeños. Trattare prima della fioritura fino ad allegazione per favorire la fertilità del polline e l'ingrossamento dei frutti onde evitare la caduta di fiori e piccoli frutti. Aplicar desde antes da floração até ao vingamento para favorecer a fertilidade do pólen e a engorda dos frutos para evitar a queda de flores e pequenos frutos.	0,2-0,3 Kg/ha
Cucurbitáceas Cucurbitaceae Cucurbitáceas	Aplicar antes de floración para favorecer el cuajado de frutos. Trattare prima della fioritura per favorire l'allegagione. Aplicar antes de floração para melhorar vingamento.	0,2-0,5 Kg/ha
Frutales de hueso (cerezo, albaricoquero y ciruelo) Drapaceae (ciliegio, albicocco e prugnolo) Prunoidéas (Cerejeira, damasqueiro, ameixeira)	Aplicar desde antes de la floración hasta el cuajado del fruto para favorecer la fertilidad del polen y el engorde de frutos. Trattare da prima della fioritura ad allegazione per favorire la fertilità del polline e l'ingrossamento dei frutti. Aplicar de antes da floração até ao vingamento para favorecer a fertilidade do pólen e a engorde dos frutos.	0,2-0,5 Kg/ha
Y Frutales de pepita Pomaceae (Melo e pero) Pomoidéas	Puede usarse para reducir excesos vegetativos y favorecer la lignificación de la madera antes de la parada invernal, consultar dosis. Può essere utilizzato su drupacee per ridurre gli eccessi vegetativi e favorire la lignificazione del legno prima della sosta invernale, consultare il ns Dep. Tecnico per il corretto dosaggio. Pode ser usado para reduzir os excessos vegetativos e favorecer a lignificação da madeira antes da paragem de inverno, consultar a dosagem.	
Hortícolas y hortalizas de hoja Orticole e Orticole da foglia Hortícolas e hortícolas de folha	Ayuda a la metabolización del nitrato en el interior de la hoja, evitando acumulaciones. Aplicar de 10-15 días después del trasplante. Repetir a intervalos de 7-10 días si es necesario. Aiuta la metabolizzazione del nitrato all'interno della foglia, evitando pericolosi accumuli. Applicare 10-15 giorni dopo il trapianto. Ripetere a intervalli di 7-10 giorni, se necessario. Ajuda na metabolização do azoto no interior da folha, evitando acumulações. Aplique 10-15 dias após o transplante. Repita em intervalos de 7 a 10 dias, se necessário.	0,2-0,5 Kg/ha
Melón y Sandía Melone e anguria Melão e melancia	Aplicar antes de floración para favorecer el cuajado de los frutos. Trattare prima della fioritura per favorire l'allegagione. Aplicar antes de floração para melhorar vingamento.	0,2-0,5 Kg/ha
Olivo Olivo Oliveira	Aplicar antes de floración para favorecer el cuajado de los frutos. Trattare prima della fioritura per favorire l'allegagione. Aplicar antes de floração para melhorar vingamento.	0,2-0,5 Kg/ha
Ornamentales Ornamentali Ornamentais	Aplicar en caso de carencias de molibdeno y antes de la floración. Trattare in caso di carenze di molibdeno e prima della fioritura. Aplique em caso de carências de molibdénio e antes da floração.	0,06-0,09 Kg/ha (0,05-0,07 Kg/ha)
Subtropicales (Aguaicete, platanera,...etc) Culture tropical (Banana, avocado,...etc) Subtropicales (Abacate, bananeira,...etc)	En aguacate aplicar antes de floración para incrementar el cuajado de los frutos. Se puede repetir el tratamiento después del cuajado para reducir la purga natural de frutos pequeños. In platanera aplicar antes de floración para mejorar el cuajado de los frutos. Su avocado aplicar prima della fioritura per aumentare l'allegagione. Il trattamento può essere ripetuto dopo l'allegagione per ridurre la naturale cascata dei piccoli frutti. Su banana trattare prima della fioritura per favorire l'allegagione. No abacate aplicar antes de floração para aumentar o vingamento. O tratamento pode ser repetido após o vingamento para reduzir a queda natural de pequenos frutos. Em bananeira aplicar antes de floração para melhorar vingamento.	0,2-0,5 Kg/ha
Tomate Pomodoro Tomate	Mejora la calidad y fertilidad del polen ayudando al cuajado de los frutos. Migliora la qualità e la fertilità del polline favorendo l'allegagione. Melhora a qualidade e a fertilidade do pólen, ajudando o vingamento.	0,2-0,5 Kg/ha
Vid de mesa y vinificación Uva da tavola e da vino Uva de mesa e de vinificação	Aplicar antes de floración para favorecer el cuajado de frutos. Trattare prima della fioritura per favorire l'allegagione. Aplicar antes de floração para melhorar vingamento.	0,25-0,5 Kg/ha

COMPATIBILIDADES: es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes del mercado, no obstante, no se recomienda mezclar con cobre o aminoácidos. Hacer una mezcla previa en caso de duda.

PRECAUCIONES
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.
P200 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280 Llevar ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.
P280 No respirar el polvo.
EUH410 Puede solitarse la ficha de datos de seguridad.

COMPATIBILITÀ: È compatibile con la maggior parte dei prodotti e fertilizzanti fitosanitari presenti sul mercato, tuttavia, non è consigliabile miscelar con rame o aminoacidi. Preparare una miscela preliminare in caso di dubbio.

PRECAUZIONI
P102 Tenersi fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
P200 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso.
P280 Non respirare il polvere.
EUH410 Si può sollecitare la scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

COMPATIBILIDADE: É compatível com a maioria dos produtos fitossanitários e fertilizantes do mercado, no entanto, não é recomendável misturar com cobre ou aminoácidos. Fazer uma mistura preliminar em caso de dúvida.

PRECAUÇÕES
P102 Manter fora do alcance das crianças.
P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções.
P200 Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto.
P280 Usar vestuário de proteção, proteção ocular, roupa e óculos facial.
P280 Não respirar as poeiras.
EUH410 Ficha de segurança fornecida a pedido.

Fabricado e distribuido por:
Fabricante e distributo da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat 321, 5º - 08029 BARCELONA - Tel. 93 495 25 00
E-mail: massoso@cquimasso.com - www.massagro.com
Securitate ITALIA: Viale Morali, 122
20099 SESTO SAN GIOVANNI (Milano). Tel. +39 02 0996 6107
E-mail: info.italia@cquimasso.com
Delegação de PORTUGAL: Rua de Ajuda, 65 - 4350-017-PORTO
Tel. / Fax. + 351 225 099 133 - E-mail: franjo@cquimasso.com

MASSÓ

*Marca registrada por / Marchio registrato da COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Barcelona

GESTIÓN DE ENVASES:
Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGRIT).

WELGRO[®] Mo

WELGRO[®] Mo

ABONO DE-MEZCLA DE MICRONUTRIENTES: HIERRO (Fe) y MOLIBDENO (Mo)
RIQUEZA GARANTIZADA:
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA 1,1% p/p. Molibdeno (Mo) soluble en agua 27% p/p. Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: 4-9. Agente quelante: EDTA.

CONCIME CE-MISCELA DI MICROELEMENTI: FERRO (Fe) E MOLIBDENO (Mo)
COMPOSIZIONE:
Ferro (Fe) solubile in acqua e chelato con EDTA 1,1% p/p. Molibdeno (Mo) solubile in acqua 27% p/p. Intervalo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-9. Agente chelante: EDTA.

ADUBO CE-MISTURA DE MICROELEMENTOS: FERRO (Fe) E MOLIBDÂNIO (Mo)
COMPOSIÇÃO:
Ferro (Fe) solúvel em água e quelatado por EDTA 1,1% p/p. Molibdânio (Mo) solúvel em água 27% p/p. Intervalo de pH que garante uma boa estabilidade da porção quelada: 4-9. Agente quelante: EDTA.

Características: WELGRO[®]Mo es un corrector de carencias de Molibdeno (Mo) de alta solubilidad para aplicación foliar. La fuente de Molibdeno, molibdato amónico, asegura una rápida asimilación por parte de las plantas sin aportar sodio. El Molibdeno (Mo) es un elemento esencial para sintetizar y activar el enzima nitrato reductasa, responsable de la oxidación del nitrato absorbido por las plantas a nitrato, forma de asimilación del nitrato en el interior de estas. Es por eso que la aplicación de **WELGRO[®]Mo**, reduce el contenido de nitratos en el interior de hortalizas (evitando acumulaciones), favorece la síntesis de aminoácidos y aumenta la fertilidad de las flores como consecuencia de la síntesis de aminoácidos. Además, es un elemento vital para el proceso de fijación de nitrógeno en los nódulos de las raíces de las leguminosas. **NOTA IMPORTANTE:** Los datos aquí contenidos se han obtenido tras profundos estudios y trabajos de campo; sin embargo, los resultados de su aplicación varían en función de la climatología, época, etc. factores que escapan a nuestro control. **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**, garantiza el contenido y riqueza del producto.

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD. NO SOBREPASAR LAS DOSIS RECOMENDADAS.

Caratteristiche: WELGRO[®]Mo è un correttore di carenze di Molibdeno (Mo) altamente solubile per applicazioni fogliari. La fonte di Molibdeno impiegata (molibdato ammonico) ne assicura una veloce assimilazione da parte delle piante senza apportare del sodio (Na). Il molibdeno (Mo) è un microelemento essenziale per la sintesi e l'attivazione dell'enzima nitrato riduttasi, responsabile dell'ossidazione del nitrato assorbito dalle piante a nitrato, forma di assimilazione dell'azoto all'interno delle stesse. È per questo motivo che applicando **WELGRO[®]Mo**, si riduce il contenuto di nitrati all'interno degli ortaggi (evitandone un loro accumulo) e si favorisce la sintesi di aminoacidi aumentando la fertilità dei fiori. Inoltre il molibdeno è un elemento vitale per il processo di fissazione dell'azoto nei noduli delle radici delle piante leguminose. **AVVERTENZE:** Le informazioni riportate sono il risultato di studi approfonditi e di sperimentazioni di campo; i risultati delle applicazioni variano in funzione dell'andamento climatico, dello sviluppo vegetativo e dell'epoca di applicazione; fattori indipendenti dalla qualità del prodotto. **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.** garantisce la qualità del prodotto e la concentrazione in elementi nutritivi.

LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DELL'USO. DA UTILIZZARE SOLTANO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO. NON SUPERARE LE DOSI APPROPRIATE.

Características: WELGRO[®]Mo é um corretivo de carências de Molibdénio (Mo) de alta solubilidade para aplicação foliar. A fonte de Molibdénio, molibdato amónico, assegura uma rápida assimilação por parte das plantas sem adição de sódio. O Molibdénio (Mo) é um elemento essencial para sintetizar e ativar a enzima nitrato reductase, responsável pela oxidação do nitrato absorvido pelas plantas a nitrato, forma de assimilação do azoto no seu interior. É por isso que a aplicação de **WELGRO[®]Mo**, reduz o teor de nitratos no interior de hortícolas (evitando acumulações), favorece a síntese de aminoácidos e aumenta a fertilidade das flores como consequência da síntese de aminoácidos. Além disso é um elemento vital para o processo de fixação de azoto nos nódulos das raízes das leguminosas. **NOTA IMPORTANTE:** Os dados aqui referidos foram obtidos a través de profundos estudos e ensaios de campo; contudo os resultados da aplicação do produto variem com o clima, época de aplicação e com outros factores que escapam ao nosso controlo, pelo que a **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.** apenas se responsabiliza pelos teores e natureza dos nutrientes indicados.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. UTILIZAR APENAS EM CASO DE NECESSIDADE COMPROVADA. NÃO ULTRAPASSAR AS DOSES ADEQUADAS.

CONTENIDO NETO:
CONTENUTO NETTO:
CONTEÚDO NETO:
1 Kg

Lote y fecha de fabricación:
Ver marcado impreso
Partita nº e data di fabbricazione:
Vedi su questa confezione
Lote e data de fabrico:
Ver na embalagem