800 mm

15 mm | 120 mm | 130 mm | 122,5 mm | 122,5 mm | 130 mm | 130 mm | 15 mm | 15 mm

370 mm

CALIBITT® R

RADICULAR · RADICALE · RADICULAR

IL **CALCIO** AD ALTA EFFICACIA

CORRETTORE DI CALCIO PER APPLICAZIONI IN FERTIRRIGAZIONE DI VARIE COLTURE

FORMULAZIONE SPECIALMENTE IDEATA PER TRATTAMENTI VIA RADICALE VISTO L'OTTIMO ASSORBIMENTO DEL PRODOTTO DA PARTE DELLA COLTURA TRATTATA

CONCIME INORGANICO SOLIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI - PFC1 (C)(I)(a)(i)
FORMIATO DI CALCIO

CONTENUTI DICHIARATI: 34% p/p Ossido de calcio (CaO) idrosolubile.
INGREDIENTI: Formiato di cálcio (nº CAS 544-17-2) (CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo), Lignosolfonato di ammonio (nº CAS 8061-53-8) (CMC1).
Granulometria: Polvere. Il 90% del prodotto passa attraverso un setaccio con maglie di 500 micron.

PERICOLO

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE
H318 Provoca gravi lesioni oculari. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P261 Evitare di respirare la polvere. P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. **Contiene: Calcium diformate.**
UFI: 00F3-J09M-H002-1HHJ.
AL FINE DI EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER IL MEDIO AMBIENTE, SEGUA LE ISTRUZIONI DI IMPIEGO.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
CONSERVARE IL PRODOTTO IN UN LUOGO ASCIUTTO E BEN VENTILATO, LONTANO DALLA LUCE SOLARE DIRETTA. TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE TRA 5 E 35°. I CONTENITORI PARZIALMENTE UTILIZZATI DEVONO ESSERE CHIUSI CORRETTAMENTE.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ
Le raccomandazioni e le informazioni che facilitiamo sono il frutto di ampi e rigorosi studi in laboratorio ed in pieno campo. Tuttavia, al momento dell'impiego del prodotto, possono intervenire numerosi fattori che esulano dal nostro controllo (preparazione della miscela, applicazione, climatologia,...). La Comercial Química Massó garantisce la composizione, formulazione e contenuto, l'utilizzatore finale sarà responsabile dei danni causati (mancanza di efficacia, tossicità in generale, residui,...) per non aver rispettato in maniera totale o parziale l'Istruzioni riportate nell'etichetta.
È compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari.
LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DELL'USO.

ARVAN

O **CÁLCIO** DE ELEVADA EFICÁCIA

CORRECTIVO DE CÁLCIO PARA APLICAR PREFERENCIALMENTE EM FERTIRRIGAÇÃO EM VÁRIAS CULTURAS

FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA UMA BOA ABSORÇÃO VIA RADICULAR

ADUBO INORGÂNICO ELEMENTAR SÓLIDO DE MACRONUTRIENTE - CFP1 (C)(I)(a)(i)
FORMIATO CÁLCICO

TEORES DECLARADOS: 34% p/p Óxido de cálcio (CaO) solível em água.
INGREDIENTES: Formiato cálcico (nº CAS 544-17-2) (CMC1: Substâncias e misturas à base de matérias virgens), Lignosulfonato de amónio (nº CAS 8061-53-8) (CMC1).
Granulometria: Pó. 90% do produto passa por um peneiro de 500 mícrons.

PERIGO

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
H318 Provoca lesões oculares graves. P102 Manter fora do alcance das crianças. P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções. P261 Evitar respirar as poeiras. P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 Usar luvas de protecção. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, um médico. **Contém: Calcium diformate. UFI: 00F3-J09M-H002-1HHJ.**
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E O AMBIENTE SIGA AS INSTRUÇÕES.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
CONSERVAR O PRODUTO EM UM ESPAÇO SECO E BEM VENTILADO, LONGE DA LUZ SOLAR DIRETA. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO ENTRE 5 E 35°. OS RECIPIENTES PARCIALMENTE USADOS DEVEM SER FECHADOS ADEQUADAMENTE.

ADVERTÊNCIAS E COMPATIBILIDADES EM TANK MIX
As informações e recomendações que disponibilizamos, são fruto de amplos e rigorosos ensaios. Na sua utilização [illegible] numerosos fatores fora do nosso domínio (preparação da mistura, aplicação, climatologia, etc.). COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ a sua composição, formulação e conteúdo. Por isso, o utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções desta etiqueta.
É compatível com a maioria dos produtos fitosanitários, tanto no aspecto de mistura física no tanque como de efeito biológico na cultura.
LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

CALIBITT® R RADICULAR · RADICALE · RADICULAR

CALIBITT® R

RADICULAR · RADICALE · RADICULAR

EL **CALCIO** DE LA ALTA EFICIENCIA

CORRECTOR DE CALCIO PARA APLICAR PREFERENTEMENTE POR FERTIRRIGACIÓN EN VARIOS CULTIVOS

FORMULACIÓN ESPECIALMENTE ESTUDIADA PARA UNA ÓPTIMA ABSORCIÓN POR VÍA RADICULAR

IL **CALCIO** AD ALTA EFFICACIA

CORRETTORE DI CALCIO PER APPLICAZIONI IN FERTIRRIGAZIONE DI VARIE COLTURE

FORMULAZIONE SPECIALMENTE IDEATA PER TRATTAMENTI VIA RADICALE VISTO L'OTTIMO ASSORBIMENTO DEL PRODOTTO DA PARTE DELLA COLTURA TRATTATA

O **CÁLCIO** DE ELEVADA EFICÁCIA

CORRECTIVO DE CÁLCIO PARA APLICAR PREFERENCIALMENTE EM FERTIRRIGAÇÃO EM VÁRIAS CULTURAS

FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA UMA BOA ABSORÇÃO VIA RADICULAR

Lote y fecha de fabricación: *Ver marcado impreso*
Partita n.: Vedi corpo della confezione
Nº lote e data de fabrico: Ver no embalagem

MASSÓ AGRO DEPARTMENT

CE

CONTENIDO NETO/CONTENUTO NETTO/CONTEÚDO NETO:

5 kg

CALIBITT® R RADICULAR · RADICALE · RADICULAR

CALIBITT® R

RADICULAR · RADICALE · RADICULAR

EL **CALCIO** DE LA ALTA EFICIENCIA

CORRECTOR DE CALCIO PARA APLICAR PREFERENTEMENTE POR FERTIRRIGACIÓN EN VARIOS CULTIVOS

FORMULACIÓN ESPECIALMENTE ESTUDIADA PARA UNA ÓPTIMA ABSORCIÓN POR VÍA RADICULAR

ABONO INORGÁNICO SÓLIDO SIMPLE A BASE DE MACRONUTRIENTES - CFP1 (C)(I)(a)(i)
FORMIATO CÁLCICO

CONTENIDOS DECLARADOS: 34% p/p Óxido de calcio (CaO) soluble en agua.
INGREDIENTES: Formiato cálcico (nº CAS 544-17-2) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes), Lignosulfonato de amonio (nº CAS 8061-53-8) (CMC1).
Granulometría: Polvo. El 90% del producto pasa por un tamiz de 500 micras.

PELIGRO

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
H318 Provoca lesiones oculares graves. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P261 Evitar respirar el polvo. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 Llevar guantes de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. **Contiene: Calcium diformate.**
UFI: 00F3-J09M-H002-1HHJ.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
ALMACENE EL PRODUCTO EN UN ESPACIO SECO Y BIEN VENTILADO ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO ENTRE 5 Y 35°. LOS ENVASES PARCIALMENTE USADOS DEBEN CERRARSE CORRECTAMENTE.

ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES EN TANK MIX
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc), por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.
Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios, tanto en lo relativo a la mezcla física en el tanque o en relación al efecto biológico en el cultivo.
LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

CULTIVO / CULTURA / CULTURA	MOMENTO DE APLICACIÓN / MOMENTO D'APPLICAZIONE / MOMENTO DE APLICAÇÃO
MANZANO	Para prevenir Bitter pit y mejorar la consistencia y la calidad de la conservación. Aplicar desde floración.
MELO	Per la prevenzione del Bitter pit così come per migliorare la consistenza del frutto e la sua qualità in generale. Applicare a partire dalla fioritura.
MACEIRA	Para prevenir Bitter pit e melhorar a consistência e a qualidade. Aplicar desde floração.
CEREZO, PARAGUAYO, MELOCOTONERO Y NECTARINO	Para prevenir el cuajado, mejorar la consistencia del fruto y la mejor calidad de conservación en postcosecha. Aplicar desde cuajado.
CILIEGIO, PESCO, NETTARINA,TABACCHERA	Per prevenire i fenomeni di cracking, migliorare la consistenza del frutto così come una maggior qualità e conservazione in post-raccolta. Applicare a partire dall'allegagione.
CEREJEIRA, PARAGUAIO, PESSEGUEIRO E NECTARINA	Para prevenir o rachamento, melhorar a consistência do fruto e a melhor qualidade de conservação em pós-colheita. Aplicar desde o vingamento do fruto.
CÍTRICOS	Para evitar el rajado, picado y separación de la corteza. Aplicar desde junio hasta septiembre.
AGRUMI	Prevenire il fenomeno del cracking. Applicare da giugno fino a settembre.
CITRINOS	Para evitar o rachamento, picado e separação da casca. Aplicar de junho a setembro.
UVA DE MESA Y DE VINIFICACIÓN	Para evitar el rajado y la consistencia del fruto. Aplicar desde cuajado.
UVA DA VINHO E DA TABOLA	Per evitare il fenómeno del cracking e migliorare la consistenza del frutto. Applicare a partire dall'allegagione.
UVA DE MESA E DE VINIFICAÇÃO	Para evitar o rachamento e a consistência dos frutos. Aplicar desde o vingamento.
TOMATE Y PIMIENTO	Para prevenir la "presta" (Fruit set), dar firmeza y calidad. Aplicar desde la formación del es ramilletes.
POMODORO E PEPERONE	Per prevenire il marciume apicale del frutto (Fruit set), dare una maggiore consistenza e qualità al frutto finale. Applicare a partire dalla formazione dei grappoli.
TOMATE E PIMENTO	Para prevenir Fruit set e dar firmeza e qualidade. Aplicar desde a formação dos ramalhetes.
LECHUGA, COL, CUCURBITÁCEAS	Para prevenir el Tip burn (necrosis foliar) y mejorar la conservación. Aplicar después del transplante o inicio de floración.
LATTUGA, BROCCOLO, CUCURBITACEE IN GENERALE	Per prevenire il Tip burn (necrosi fogliari). Applicare dal trapianto all'inizio della fioritura.
ALFACE, COUVE, CUCURBITACEAS	Para prevenir necrose foliar. Aplicar depois do transplante ou início de floração.
OTROS FRUTOS, PLATANERA, KIWI, TROPICALES, etc.	Carencia de Ca en el suelo. En general mejora la firmeza, la calidad y la conservación.
KIWI ED ALTRI FRUTTI IN GENERALE	Carenze di calcio (Ca) nel terreno. In generale migliora la turgidità, la qualità e la conservazione dei frutto.
OUTROS FRUTOS, KIWI, TROPICAIS, etc.	Carência de Ca no solo. Em geral melhora a firmeza, a qualidade e a conservação.
FRESA Y OTRAS BERRIES	Mejora la firmeza, el aspecto y la conservación (postcosecha).
FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI	Migliora la consistenza, l'aspetto e la conservazione (post-raccolta).
MORANGO E OUTRAS BAGAS	Melhora a firmeza, o aspeto e a conservação (pós-colheita).

ES *La dosis general de aplicación es de 10-20 kg/ha según cultivos siempre repartidas en varias aplicaciones, según ciclo de cultivo.*
IT *La dose generale di applicazione è di 10-20 kg/ha in funzione della coltura e ripartendolo in varie applicazioni a seconda del ciclo colturale della pianta.*
PT *A dose geral de aplicação é de 10-20 kg/ha conforme as culturas sempre fracionadas em várias aplicações, segundo o ciclo da cultura.*

Fabricado por / Fabbricante / Fabricante: **BOLSA/SACCHETTO/SAQUETA** LDPE 4

MASSÓ
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Vladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (España)
Tel. +34 93 495 25 00 - E-mail: massos@cqmasso.com - www.massoagro.com

Succursale ITALIA: V.le Fulvio Testi, 59 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 61868218 - Fax +39 02 61866217 - E-mail: info.italia@cqmasso.com

Delegação de PORTUGAL: Rua Banda de Música de Moreira, 58 - 4470-197 MOREIRA-MAIA
Contacto: +351 917 765 356 (Chamada para a rede móvel nacional) - Email: framito@cqmasso.com

V.3

www.massoagro.com